I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

Che tipo di vaccino viene dato ai bambini nella fascia 5-11 anni?

Il vaccino pediatrico approvato dall'Ema, quello di Pfizer-Biontech, ha lo stesso principio attivo di quello per gli adulti (vaccino a mRna). Nel caso dei più piccoli però la dose è di circa un terzo rispetto agli altri.

La vaccinazione avviene in due dosi a tre settimane di distanza l'una dall'altra.

www.iss.it

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

Cosa devo fare PRIMA del vaccino?

Parla con il bambino prima della vaccinazione per spiegargli bene cosa sta per fare

www.iss.it

ISTITVTO SVPERIORE DI SANITÀ

I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

Cosa devo fare PRIMA del vaccino?

Non è raccomandato dare farmaci antidolorifici prima della vaccinazione per cercare di prevenire eventuali effetti collaterali

www.iss.it

ISTITVTO SVPERIORE DI SANITÀ

I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

Cosa devo fare PRIMA del vaccino?



Riporta al medico vaccinatore eventuali episodi di allergie avuti dal bambino

www.iss.it

ISTITVTO SVPERIORE DI SANITÀ

I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

Cosa devo fare PRIMA del vaccino?

Per prevenire traumi dovuti ad un eventuale svenimento durante la vaccinazione il bambino deve stare seduto o sdraiato

www.iss.it

I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

E DOPO il vaccino?



Dopo la vaccinazione ti verrà chiesto di attendere 15-30 minuti sotto osservazione prima di lasciare il centro vaccinale per monitorare l'eventuale comparsa di reazioni allergiche e, nel caso, poter intervenire tempestivamente

www.iss.it

ISTITVTO SVPERIORE DI SANITÀ

I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

Quali sono i principali effetti collaterali?

Nel braccio dove è stata fatta l'iniezione potrebbero verificarsi dolore, rossore e gonfiore

www.iss.it

ISTITVTO SVPERIORE DI SANITÀ

I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

Quali sono i principali effetti collaterali?



Potrebbero inoltre manifestarsi sintomi quali stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, brividi, febbre e nausea. Tali sintomi sono generalmente di lieve entità e si risolvono nel giro di 1-2 giorni

www.iss.it

ISTITVTO SVPERIORE DI SANITÀ

I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

Che tipo di vaccino viene dato ai bambini nella fascia 5-11 anni?

Il vaccino pediatrico approvato dall'Ema, quello di Pfizer-Biontech, ha lo stesso principio attivo di quello per gli adulti (vaccino a mRna). Nel caso dei più piccoli però la dose è di circa un terzo rispetto agli altri.
La vaccinazione avviene in due dosi a tre s ettimane di distanza l'una dall'altra.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

www.iss.it

I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

Cosa devo fare PRIMA del vaccino?

Parla con il bambino prima della vaccinazione per spiegargli bene cosa sta per fare

Non è raccomandato dare farmaci antidolorifici prima della vaccinazione per cercare di prevenire eventuali effetti collaterali

Riporta al medico vaccinatore eventuali episodi di allergie avuti dal bambino

Per prevenire traumi dovuti ad un eventuale svenimento durante la vaccinazione il bambino deve stare seduto o sdraiato

ISTITVTO SVPERIORE DI SANITÀ

www.iss.it

I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

Quali sono i principali effetti collaterali?

Nel braccio dove
è stata fatta l'iniezione
potrebbero verificarsi
dolore, rossore
e gonfiore

Potrebbero inoltre manifestarsi sintomi quali stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, brividi, febbre e nausea. Tali sintomi sono generalmente di lieve entità e si risolvono nel giro di 1-2 giorni

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

www.iss.it

I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

E DOPO il vaccino?

Dopo la vaccinazione ti verrà chiesto di attendere 15-30 minuti sotto osservazione prima di lasciare il centro vaccinale per monitorare l'eventuale comparsa di reazioni allergiche e, nel caso, poter intervenire tempestivamente



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

www.iss.it

I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

Cosa devo fare PRIMA del vaccino?

Non è raccomandato dare farmaci antidolorifici prima della vaccinazione per cercare di prevenire eventuali effetti collaterali

www.iss.it

ISTITVTO SVPERIORE DI SANITÀ

I VACCINI IN ETÀ PEDIATRICA

Cosa devo fare PRIMA del vaccino?

Parla con il bambino prima della vaccinazione per spiegargli bene cosa sta per fare

Non è raccomandato dare farmaci antidolorifici prima della vaccinazione per cercare di prevenire eventuali effetti collaterali

Riporta al medico vaccinatore eventuali episodi di allergie avuti dal bambino

Per prevenire traumi dovuti ad un eventuale svenimento durante la vaccinazione il bambino deve stare seduto o sdraiato

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

www.iss.it